

PROTOCOLLO PER LA SELEZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI DEL FVG

INTRODUZIONE

In FVG gli operatori addetti alla raccolta sangue utilizzano già da diversi anni un documento comune per la selezione del donatore redatto dal GdL tecnico regionale sulla donazione. Tale documento era il frutto di un percorso metodologico per l'armonizzazione dei criteri di selezione del donatore per approfondire e uniformare le attività di selezione.

Il GdL ha deciso una revisione di tale documento alla luce della emanazione del nuovo decreto e l'adozione del nuovo questionario, connesso al decreto.

Il nuovo decreto prevede che tutto il materiale informativo, il questionario e la documentazione devono essere in lingua italiana, fatta eccezione per le aree di bilinguismo riconosciute dalla legge. Il donatore deve poter dimostrare l'effettiva capacità di leggere e comprendere il materiale informativo, il questionario e la documentazione che gli sono stati forniti.

Il protocollo è inteso come tappa iniziale di un processo continuo di aggiornamento e formazione e previsto in formato cartaceo ed informatico su due livelli:

- **sintetico**: vuole essere uno strumento di lavoro di rapida e facile consultazione per i medici e gli infermieri addetti alla raccolta di sangue e/o emocomponenti e per le Associazioni dei donatori.
- **completo** comprende approfondimenti riferiti ai singoli provvedimenti, anche non espressamente esplicitati nei decreti

hanno collaborato alla realizzazione del progetto: S. Da Ros, P.Dolfini, P.Polito, V. Totis, L.ZAndomeni

il documento viene approvato dal Coordinatore regionale delle attività trasfusionali e dai Direttori di Dipartimento: V. De Angelis, R. Catapano; L.Mascaretti.

MODALITA' DI REVISIONE

il presente documento sarà sottoposto a revisione con cadenza almeno biennale

REQUISITI PER DONARE

requisiti generali per i vari tipi di donazione : sangue intero, plasma e piastrine in aferesi :

DONAZIONI	SANGUE INTERO (S.I)	PLASMAFERESI (PL)	PIASTRINE (PLT)
Deve essere accertata la piena comprensione delle domande da parte del donatore soprattutto se straniero			
Età minima	18 anni	18 anni	18 anni
Eta massima	Se nuovo donatore 60 anni (60-65 su giudizio medico) se donatore periodico 65 anni se donatore periodico >65°. in buona salute che non assume terapia farmacologica continuativa, previa valutazione ECG annuale fino a 70	60 anni per plasmaferesi continuativa (≥12) purché proteine tot >6g e quadro elettroforetico normale 65-70 anni (3 donazioni tra sangue e plasma)	65 anni
Peso minimo	50 kg	50 kg	50 kg
Frequenza cardiaca	regolare Tra 50 e 100 frequenze inferiori accettate negli sportivi		
Pressione arteriosa	La pressione sistolica deve essere ≤180 la diastolica ≤100		
Emoglobina	hb ≥ 12,5g/dl nella donna hb ≥ 13,5/dl nell'uomo il protocollo regionale non prevede deroghe per i talassemici	Periodicità <90 gg hb ≥ 12,5g/dl nella donna hb ≥ 13,5g/dl nell'uomo Periodicità >90 gg hb ≥ 11,5g/dl nella donna hb ≥ 12,5 nell'uomo ematocrito consigliato < 48%	hb ≥ 12,5g/dl nella donna hb ≥ 13,5 nell'uomo
Piastrine	Vedere piastrinopenie	Vedere piastrinopenie	PLT ≥ 200.000/ml
Prot. Totali/elettroforesi/pt-ptt		Se plasmaferesi continuativa prot. totali > 6g/ml elettroforesi normale	PT-PTT nella norma verificato alla prima donazione e almeno 1 volta anno
quantità	450 cc	Se donna con peso < 58kg: cc 600 compreso anticoag. Se donna >58Kg e/o uomo cc 600 senza anticoag	Contenuto plt > 2 x 10 ¹¹
intervallo	90gg tra 2 donazioni SI 14 gg dopo PL-PLT-PLPLT	14 gg tra 2 donazioni in aferesi 30gg dopo una donazione SI max 12 litri/anno	14 gg tra 2 donazioni in aferesi 30gg dopo una donazione SI max 6 donazioni plt
I donatori addetti a lavori pesanti o che hanno particolare influenza sulla propria e sull'altrui incolumità	Possono donare se possono effettuare una giornata di riposo dopo la donazione		
Requisiti particolari per vari tipi di donazione			
TRALI • donatrici con almeno 1 gravidanza/interruzione di	Idonea/o EC uso clinico BC uso clinico	Idonea/o solo per il plasma per uso industriale	Non idonea/o in casi particolari (p con gruppi rari o emergenza):

gravidanza • donatori trasfusi con emocomponenti	PL : per uso industriale		idonea/o se si utilizzano PLT secche o lavate
Test Coombs indiretto positivo	Idonea/o EC uso clinico BC uso clinico PL : eliminazione	Non idoneo	Non idoneo

Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici

Ad ogni donazione il donatore deve essere sottoposto ad:

Esame emocromocitometrico completo

Esami per la qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti:

HBsAg
HCV Ab
HIV 1-2 Ab
Sierodiagnosi per la lue
HCV NAT
HBV NAT
HIV-1 NAT

Per ciascuna di queste indagini, in caso di campioni inizialmente reattivi deve essere applicato l'algoritmo diagnostico..

In occasione della prima donazione devono essere inoltre eseguiti i seguenti esami:

Fenotipo AB0 mediante test diretto e indiretto
Fenotipo Rh completo
Antigene Kell
Ricerca degli anticorpi anti-eritrocitari irregolari

Alla seconda donazione devono essere confermati fenotipo AB0 ed Rh completo e l'antigene Kell. Su ogni successiva donazione devono essere confermati il fenotipo AB0 (solo test diretto) ed Rh (D) e ricerca Ac anti CMV, secondo algoritmo regionale ; la ricerca di anticorpi anti-eritrocitari irregolari deve essere ripetuta in presenza di eventi che possono determinare una stimolazione immunologica del/della donatore/donatrice.

Il donatore periodico è sottoposto, con cadenza almeno annuale, ai seguenti controlli ematochimici, **volti a valutare il complessivo stato di salute del donatore stesso:**

creatininemia
glicemia
ALT
proteidemia totale
colesterolo totale
colesterolo HDL
trigliceridemia
ferritinemia

Il test ALT non è necessario per la validazione delle unità.

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

NEOPLASIE neoplasie maligne solide, ematologiche o associate a condizioni viremiche.	Esclusione permanente Possono essere accettati donatori con storia di carcinoma basocellulare o carcinoma in situ della cervice dopo rimozione della neoplasia
TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO, DI CSE	Esclusione permanente
XENOTRAPIANTI	Esclusione permanente
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TSE , MORBO DI CREUTZFELD -JACOB, VARIANTE DEL MORBO DI CREUTZFELD -JACOB -soggiorno per più di sei mesi nel Regno Unito dal 1980 al 1996; -trasfusioni nel Regno Unito in tale periodo	Esclusione permanente
ALCOLISMO CRONICO	Esclusione permanente
ANAFILASSI	Esclusione permanente
ASSUNZIONE DI SOSTANZE FARMACOLOGICHE uso non prescritto di sostanze farmacologiche o principi attivi per viaIM, EV, o tramite altri strumenti in grado di trasmettere gravi malattie infettive, comprese sostanze stupefacenti, steroidi, ormoni a scopo di culturismo fisico	Esclusione permanente
COMPORAMENTO SESSUALE comportamento sessuale abituale e reiterato (promiscuità, occasionalità, mercenarietà dei rapporti sessuali) li espone ad elevato rischio di contrarre malattie trasmissibili con il sangue	Esclusione permanente
<u>INTERVENTI CHIRURGICI E ALTRE SITUAZIONI DI ESPOSIZIONE A RISCHIO DI CONTRARRE UN'INFEZIONE TRASMISSIBILE CON IL SANGUE</u>	
INTERVENTO CHIRURGICO MAGGIORE	Esclusione temporanea di 4 mesi in condizioni di recupero dello stato di salute
INTERVENTO CHIRURGICO MINORE	Esclusione temporanea di 7gg dalla completa guarigione
FRATTURE	Esclusione temporanea fino a rimozione gessatura in benessere e/o dopo 15 gg dalla sospensione della terapia con EBPM . Idoneo a giudizio del medico per piccole fratture
CURE ODONTOIATRICHE -igiene e cure odontoiatriche minore -Estrazioni non complicate, devitalizzazioni, implantologia	Esclusione temporanea di 48 h Esclusione temporanea di 7 gg

-innesto tessuto osseo autologo o omologo	Esclusione temporanea di 4 mesi
ESAME ENDOSCOPICI CON STRUMENTI FLESSIBILI	Esclusione temporanea di 4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio
SPRUZZO DELLE MUCOSE CON SANGUE O LESIONI DA AGO	Esclusione temporanea di 4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio
TRASFUSIONE DI EMOCOMPONENTI O SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI	Esclusione temporanea di 4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio
TRAPIANTI DI TESSUTI O CELLULE DI ORIGINE UMANA (eccetto CSE)	Esclusione temporanea di 4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio
TATUAGGI O BODY PIERCING	Esclusione temporanea di 4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio
AGOPUNTURA, SE NON ESEGUITA DA PROFESSIONISTI QUALIFICATI CON AGHI USA E GETTA	Esclusione temporanea di 4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio
CONVIVENZA PROLUNGATA E ABITUALE CON SOGGETTO, NON PARTNER SESSUALE CON POSITIVITA'PER HbsAg e/o HCV	Esclusione temporanea di 4 mesi dopo la cessazione della convivenza, anche se il donatore è vaccinato
CONVIVENZA OCCASIONALE CON SOGGETTO, NON PARTNER SESSUALE CON POSITIVITA'PER HBsAg e/o HCV	Esclusione temporanea di 4 mesi dall'ultima esposizione, anche se il donatore è vaccinato; <i>si intende convivenza occasionale un periodo di sei mesi (anche non continuativi) negli ultimi due anni; il periodo di sospensione si applica per quattro mesi dall'ultimo giorno dell'ultima permanenza</i>
RAPPORTI SESSUALI A RISCHIO	Esclusione temporanea di 4 mesi (anche se protetto) dall'ultima esposizione ad una o più delle condizioni di rischio, rappresentate da rapporti sessuali, eterosessuali e/o omosessuali: <ul style="list-style-type: none"> • con partner risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e/o per l'AIDS o a rischio di esserlo • con partner che ha avuto precedenti comportamenti sessuali a rischio o del quale il donatore ignora le abitudini sessuali • con partner occasionale • con più partner sessuali • con soggetti tossicodipendenti • con scambio di denaro e droga • con partner occasionale nato o proveniente da paesi esteri dove l'AIDS è una malattia diffusa
<u>PATOLOGIE</u>	
L'eventuale consulenza specialistica deve essere intesa come supporto al Medico addetto alla selezione per una valutazione più approfondita dell'idoneità del donatore.	
<u>PATOLOGIE INFETTIVE</u>	
Soggetti portatori di HCV HBV HIV1-2 HTLV I/II BABESIOSI LEBBRA KALA AZAR SIFILIDE FEBBE Q CRONICA	Esclusione permanente (1) i soggetti nati o con madre nata in paesi dove la malattia è endemica (America del Sud, America Centrale, Messico) o che sono stati trasfusi in tali paesi o che abbiano viaggiato in zone a rischio possono essere ammessi alla donazioni solo in presenza d un test per gli anticorpi anti-Tripanosomiasa Cruzii negativo.

M. DI CHAGAS O TRIPANOSOMIASI(1)	(donazione differita)
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE (TSE) (MORBO DI CREUTZFELD – JAKOB, NUOVA VARIANTE DEL MORBO DI CREUTZFELD – JAKOB) Persone con antecedenti medici o familiari che comportano un rischio di contrarre TSE, compresi donatori che hanno subito il trapianto della cornea e/o della dura madre e/o che in passato sono stati curati con medicinali estratti da ghiandola pituitaria umana	Esclusione permanente
REGRESSA EPATITE HBV e HCV	Esclusione permanente, in caso di anamnesi positiva o di riscontro sierologico per l'HBV di positività dell'HBc , post ripetizione dei markers
GLOMERULONEFRITE ACUTA	Esclusione temporanea 5 anni dalla guarigione completa
BRUCELLOSI FEBBRE Q OSTEOMIELETTA TBC	Esclusione temporanea 2 anni dalla guarigione completa
FEBBRE REUMATICA	Esclusione temporanea 2 anni dopo la cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica
EPATITE A	Esclusione temporanea 4 mesi
M. DI LYME	Esclusione temporanea 12 mesi
TOXOPLASMOZI MONONUCLEOSI INFETTIVA	Esclusione temporanea 6 mesi
FEBBRE > 38°C AFFEZIONI DI TIPO INFLUENZALE INFEZIONI INTESTINALI INFEZIONI RESPIRATORIE INFEZIONI URINARIE	Esclusione temporanea 15 gg dopo cessazione dei sintomi e/o terapia
RAFFREDDORE	Esclusione temporanea 15 gg dopo cessazione dei sintomi
HERPES SIMPLEX	Esclusione temporanea fino alla guarigione delle lesioni per H. Simplex
HERPES ZOOSTER	Esclusione temporanea 1 mese
WNV	Esclusione temporanea 28 gg dopo aver soggiornato per almeno una notte in un'area ove siano presenti casi di malattia nell'uomo e limitatamente ai periodi di comprovata circolazione del virus. La sospensione non si attua in caso venga eseguito lo specifico test Nat Esclusione temporanea 4 mesi dalla completa guarigione in caso di soggetto con diagnosi di infezione
MALATTIE INFETTIVE COMUNI	Esclusione temporanea 15 gg dalla guarigione

CONTATTO CON MALATTIA INFETTIVA COMUNE -senza contrarre malattia -se immunizzato	Esclusione temporanea 4 settimane idoneo
SARS Soggiorno in zone a rischio Contatti con soggetto a rischio Soggetti con malattia	Esclusione temporanea 4 settimane Esclusione temporanea 3 settimane dopo guarigione Esclusione temporanea 3 settimane dopo guarigione
MORSO DI ZECCA	Esclusione temporanea 40 gg
MALARIA	
soggetti che hanno vissuto per un periodo di 6 mesi o più continuativi in zona endemica in qualsiasi momento della loro vita	Idoneo al plasma da inviare al frazionamento industriale esclusione permanente per donazioni di sangue intero e piastrine, se non eseguito test
soggetti che hanno sofferto di malaria, soggetti che hanno sofferto di episodi febbrili non diagnosticati, compatibili con la diagnosi di malaria, durante una visita in area malarica o nei 6 mesi successivi alla fine della visita	Idoneo al plasma da inviare al frazionamento industriale esclusione permanente per donazioni di sangue intero e piastrine
Visitatori asintomatici di zone endemiche	Esclusione temporanea di 12 mesi dopo aver lasciato la zona di endemia per sangue intero e plt, se non eseguito test sierologico . Possono donare plasma per uso industriale dopo 6 mesi. In caso di esecuzione del test il periodo di sospensione è di sei mesi, anche per gli emocomponenti cellulari.
SITUAZIONI EPIDEMIOLOGICHE PARTICOLARI (AD ESEMPIO FOCOLAI DI MALATTIE)	Esclusione conforme alla situazione epidemiologica
<u>PATOLOGIE NON INFETTIVE</u>	
MALATTIE CARDIOVASCOLARI	
Nel caso in cui venga richiesta una consulenza cardiovascolare, specificare se la donazione possa rappresentare un evento dannoso per il donatore in funzione dell'alterazione cardiocircolatoria da indagare	
CARDIOPATIE CONGENITE	Esclusione permanente ad eccezione di anomalie completamente curate o corrette riammissione previa valutazione specialista
CARDIOPATIE ISCHEMICHE (infarto, angina, ischemia)	Esclusione permanente
CARDIOPATIE INFIAMMATORIE	Esclusione temporanea di 1 anno dalla guarigione clinica a condizione che non sia reliquato nessun esito . Idoneo previa valutazione specialista
DIFETTI VALVOLARI ACQUISITI	Idoneo previa valutazione specialista
ARTERIOPATIE	Esclusione permanente
ARITMIE IPERCINETICHE - Extrasistolia atriale (se numerose o con caratteristiche di pericolosità)	Idoneo previa consulenza cardiologica Esclusione permanente Presenza di patologia organica sottostante

- Extrasistolia ventricolare (se numerose o con caratteristiche di pericolosità)	
ARITMIE IPERCINETICHE - flutter e fibrillazione atriale - tachicardia parossistica sopraventricolare - Sindrome da pre-eccitazione ventricolare (WPW)*	Esclusione permanente *Idoneità in caso di guarigione (L'ablazione chirurgica del fascio accessorio garantisce una guarigione permanente delle tachicardie sopraventricolari e della maggior parte delle fibrillazioni atriali ad esse associate)
ARITMIE IPOCINETICHE blocco di branca destro	Valutazione caso per caso in rapporto alla etiologia e alle conseguenze emodinamiche del fenomeno. Opportuna una valutazione specialistica
ARITMIE IPOCINETICHE blocco di branca sinistro (anche incompleto)	Valutazione caso per caso in rapporto alla etiologia e alle conseguenze emodinamiche del fenomeno. Opportuna una valutazione specialistica
Aritmie ipocinetiche - blocco atrio-ventricolare di 1° grado	valutazione caso per caso, eventuale consulenza cardiologica
Aritmie ipocinetiche - blocco atrio-ventricolare di 2° e 3° grado	Esclusione permanente
IPERTENSIONE ARTERIOSA	Esclusione permanente con ipertensione arteriosa non in adeguato controllo farmacologico o con danno d'organo (retinico/ vascolare/ renale/ cardiaco (ecocardio) Idoneo con ipertensione controllata con trattamento farmacologico previa valutazione clinica complessiva.
MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	
BRONCOPNEUMOPATIE CRONICHE	Esclusione permanente
SARCOIDOSI	Esclusione permanente
TBC -in fase attiva -complesso primario	Esclusione temporanea di 2 anni dalla guarigione Valutazione specialista
POLMONITI VIRALI BATTERICHE	Esclusione temporanea di 1mese dalla guarigione
PNEUMOTORACE -traumatico -spontaneo	Esclusione temporanea di 4 mesi dalla guarigione
EMBOLIA POLMONARE	Valutazione caso per caso : Idoneo in base alla patologia. Riammissione eventuale dopo 6 mesi (in assenza di anomalie congenite e/o acquisite della coagulazione)
STATO DI MALE ASMATICO	Esclusione permanente
ASMA SINTOMATICO CHE RICHIEDA TERAPIA CONTINUATIVA	Esclusione permanente
ASMA ASINTOMATICO O CHE RICHIEDA TRATTAMENTO PROFILATTICO	Esclusione temporanea durante i periodi sintomatici
MALATTIE EMATOLOGICHE E IMMUNOLOGICHE	

EMOGLOBINOPATIE	Esclusione permanente Ad eccezione del trait talassemico alfa e beta
CARENZE ENZIMATICHE G.R.	Esclusione permanente
EMOCROMATOSI	Idoneo senza danno d'organo
NEOPLASIE EMATOLOGICHE	Esclusione permanente
MGUS	Esclusione permanente
PIASTRINOPENIE	1) $plt < 120 \times 10^9 /L$ Esclusione permanente 2) alla prima donazione con $plt > 120 \text{ e } < 140 \times 10^9 /L$ Esclusione permanente e invio inviato al curante (a meno che non presenti una documentazione clinica dalla quale sia possibile evincere che la conta piastrinica bassa non è legata ad una patologia); 3) se da anni, donatore periodico con $120 \text{ e } < 140 \times 10^9 /L$ senza alcuna manifestazione collaterale che indichi un disordine autoimmune può continuare a donare (esclusa la piastrinoaferesi); 4) un donatore che manifesti una riduzione progressiva nel tempo della sua conta piastrinica in precedenza su valori più elevati dovrebbe essere sospeso dalle donazioni e rinviato al curante (o studiato per identificare la causa della piastrinopenia)
DIATESI EMORRAGICHE, COAGULOPATIE	Esclusione permanente con tendenza anomala all'emorragia, o con diagnosi di coagulopatia congenita o acquisita Idoneo con una mutazione eterozigote senza anamnesi di trombosi o emorragia
MALATTIE AUTOIMMUNI	Esclusione permanente con malattia autoimmune che coinvolge più di un organo.
ALLERGIE	Idoneo se asintomatico
CRISI ALLERGICA Minore (oculo – rinite)	Idoneo dopo sette giorni dalla fine della sintomatologia
MANIFESTAZIONI ALLERGICHE GRAVI A SO- STANZE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PENICILLINA E CEFALOSPORINE E VELENO DI IMENOTTERI	Esclusione temporanea 2 mesi Plasma all'industria
TERAPIA DESENSIBILIZZANTE	Idoneo dopo una settimana dall'inoculazione (senza reazioni)
MALATTIE CUTE	

PSORIASI	Esclusione permanente se generalizzata o severa o se terapia per via generale Esclusione temporanea se presente sulla sede della flebotomia Idoneo se in terapia per uso topico e circoscritta
MALATTIE METABOLICHE ENDOCRINE	
DIABETE	Esclusione permanente se in terapia insulinica Idoneo se glicemia controllata con dieta e/o ipoglicemizzanti orali
DISLIPIDEMIE -alimentari -familiari (con anamnesi familiare positiva per eventi cardiovascolare precoce)	Idoneo Esclusione permanente
TIROIDITI AUTOIMMUNI	IDONEO se senza danno d'orgno
GOZZO NODULARE	Idoneo
IPOTIROIDISMO	Idoneo
M. DI BASEOW	Esclusione permanente
PATOLOGIE DEL CORTICOSURRENE	Esclusione permanenete
MALATTIE APPARATO OTTICO	
MALATTIE DEGENERATIVE	Esclusione permanente
GLAUCOMA	Idoneo
TRAPIANTO DI CORNEA	Esclusione permanente
DISTACCO DI RETINA -post traumatico -di nnd	Idoneo dopo guarigione Esclusione permanente
MALATTIE SNC	
MALATTIE ORGANICHE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	Esclusione permanente
PATOLOGIE ISCHEMICHE -TROMBOTICHE	Esclusione permanente
EPILESSIA	Esclusione permanente con diagnosi di epilessia e con storia clinica di crisi lipotimiche e convulsive. Idoneo con pregresse convulsioni febbrili infantili o forme di epilessia per le quali sono trascorsi 3 anni dalla cessazione della terapia anti-convulsivante senza ricadute
CRISI LIPOTIMICHE RICORRENTI	Esclusione permanente
TRAUMA CRANICO -non complicato ma con ricovero anche di breve durata -complicato (stato coma, sottoposto a intervento neuroch., ecc.)	Esclusione temporanea 1 anno , riammissione previa valutazione specialistica Esclusione permanente
INTEREVENTI DI NEUROCHIRURGIA -del SNC -del sistema nervoso periferico	Esclusione permanente Esclusione temporaneo 4 mesi (attenta valutazione)

	clinica)
TRAPIANTO DI DURA MADRE	Esclusione permanente
ETILISMO -TOSSICODIPENDENZA	Esclusione permanente
PSICOSI, NEVROSI, DEMENZA	Esclusione permanente
MALATTIE GASTROINTESTINALI	
MORBO CELIACO	Idoneo purché il donatore segua una dieta priva di glutine (è opportuno eseguire test per l'assorbimento del ferro: emocromo, sideremia, ferritina, transferrina, già alla prima donazione)
MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE (Morbo di Crohn , Colite ulcerosa ,Diverticolosi ...)	Esclusione permanente
S. MALASSORBIMENTO	Esclusione permanente
VOMITO E DIARREA	Esclusione temporanea 15 gg dalla guarigione
MALATTIE RENALI	
GLOMERULONEFRITE ACUTA	Esclusione temporanea 5 anni dalla guarigione
GLOMERULONEFRITE CRONICA	Esclusione permanente
NEFROPATIE VASCOLARI	Esclusione permanente
RENE POLICISTICO	Esclusione permanente
MALATTIE GINECOLOGICHE	
ENDOMETRIOSI	Idoneo, con valori normali di Hb
INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA	Esclusione temporanea 6 mesi
GRAVIDANZA	Esclusione temporanea durante la gravidanza e fino a 6 mesi dal parto
FARMACI	
Per qualunque terapia è essenziale la valutazione della patologia per la quale avviene l'assunzione del farmaco. Bisogna inoltre sempre valutare il metabolismo del farmaco e la sua emivita plasmatica	
ANTIPERTENSIVI	A giudizio del medico
ACEINIBITORI E SARTANICI	Idoneo anche aferesi
ANTIARITMICI CL I-III	Esclusione definitiva
ANTIBIOTICI	Esclusione temporanea per 15 giorni
CORTISONICI	Esclusione temporanea per 15 giorni
ANTIMICOTICI - sistemici - topici	Esclusione temporanea per 15 giorni Idoneo dopo valutazione della patologia
BENZODIAZEPINE - assunzione occasionale	Idoneo

- assunzione ripetuta o cronica	Esclusione temporanea o permanente a seconda della patologia
TAPAZOLO	Esclusione definitiva
IMMUNOGLOBULINE	Esclusione temporanea per 4 mesi
ANTIPROSTATICI - alfa litici - Finasteride o simili - Dutasteride (Avodart)	Esclusione temporanea per 15 giorni Esclusione temporanea per 2 mesi Esclusione temporanea per 6 mesi
ANTIDEPRESSIVI (terapia cronica)	Esclusione permanente
USO SPORADICO DELLO “SPINELLO “	Esclusione temporanea per 10 gg
TRAPIANTI D’ ORGANO	Esclusione permanente
TRASFUSIONE DI SANGUE O EMODERIVATI	Esclusione temporanea per 4 mesi. Non idoneo alla donazione di pltaferesi o di plasma per uso clinico.
VACCINAZIONI	
Difterite, tifo, paratifo, febbre delle montagne rocciose, tetano, pertosse, colera, peste, HAV, HBV, TBE, influenza, influenza A, H1N1, papillovirus rabbia senza morso di cane	Esclusione temporanea per 48 H
HBV	Esclusione temporanea 7 gg
Antirabbia dopo morso di cane risultato affetto da rabbia:	Esclusione temporanea per un anno
Vaiolo, BCG, poliomielite, morbillo, parotite, febbre gialla, tifo per os, polio ,	Esclusione temporanea per 1 mese
VIAGGI	
Per questo tema fare riferimento SIMTI “Selezione del donatore che viaggia e del cittadino extracomunitario”. In tale documento sono contenute le schede delle seguenti malattie: Dengue, Febbre di Ebola, Febbre di Lassa, Febbre Gialla, Oncocerciasi, SARS, Tifo Esantematico, Tifo Murino, Tracoma, Tripanosomiasi Africana, Febbre Aviaria, Febbre Chikungunya, WNV (ed eventuali altre malattie che verranno aggiunte alla lista, negli aggiornamenti periodici del documento stesso in base a situazioni epidemiologiche particolari o focolai di malattie).	
PAESI CON MALATTIE TROPICALI	Esclusione temporanea 6 mesi
NUOVI DONATORI PROVENIENTI DA PAESI CON UNA MAGGIORE INCIDENZA E UNA PREVALENZA DI HCV HBV SIFILIDE HIV	DONAZIONE DIFFERITA